Córdoba 2018

Las bajas dosis: ¿un problema con las técnicas modernas ?

(IMRT, VMAT, FFF, IGRT, CBCT, SBRT ...)

JM Cosset

¿Qué significa una «baja dosis» ?

- **Muy diferente** para :
- Un radioterapeuta
- Un radioproteccionista

Instituto Zunino
Fundación Marie Curie

- **Para el radioproteccionista :**
- **Dosis de algunos millisieverts**
- **Hasta alrededor de 100 mSv (siempre considerado como un «umbral» para la carcinogénesis)**
- **Representan «bajas dosis» ...**

- **Para el radioterapeuta:**
- Las dosis a distancia del volumen blanco por debajo de las isodosis 5 a 10 % , están usualmente consideradas como «bajas dosis»,
- *¡Pero representan algunos Gy !*
- **¡Dosis enormes para los radioproteccionistas!**

• ¿Qué consecuencia ?

- Las «bajas dosis» de la radioterapia deben, **en todos los casos**, ser consideradas como posiblemente **carcinogénicas**,
- Porque constantemente son (muy) superiores al «umbral» de 100 mSv
- ¡Luego, deben ser tomadas en cuenta (+++) !

¿Que dice la ley ?

- **La Directiva Europea 97/43 pnes la 2013/59:**
- « For radiotherapeutic purposes, exposures of target volumes shall be individually planned ; taking into account that **doses of non-target volumes and tissues shall be as low as reasonably achievable** and consistent with the intended radiotherapeutic purpose of the exposure. »

- **¿Cómo definir estas bajas dosis?**
- **Usualmente la dosis fuera del «PTV» se llama “non-target dose.” (dosis fuera del volumen blanco)**

Instituto Zunino
Fundación Marie Curie

- Esta dosis fuera del volumen blanco puede ser subdividida en dos categorías:
- (a) **“dosis al volumen que no es el blanco pero dentro del campo”** —, dosis fuera del volumen blanco que está dentro del borde del campo primario, tal como dosis de entrada y salida a lo largo del camino del haz.
- (b) **“dosis al volumen que no es el blanco fuera del campo”** — dosis que no sólo está fuera del PTV sino también fuera de cualquier borde del campo primario

a. “ dosis fuera del volumen blanco dentro del campo” : entradas y salidas de los haces

b. “dosis al volumen que no es blanco fuera del campo”

¡Depende de muchas causas !

Instituto Zunino

Fundación Marie Curie

Causa 1 : la dosis «scattered» (dosis dispersa) **que viene del paciente** : «1» en el dibujo ; *en rojo: el volumen tratado* .

**Causa 2 : la dosis «scattered» (dispersa)
que **viene del colimador** : «2» del dibujo.**

**Causa 3 : la dosis «scattered» que viene del
cabezal de la máquina («leakage» o rayos de
fuga): «3» del dibujo.**

- **Causa 4 : la dosis «scattered» que viene de las paredes y del techo de la sala de tratamiento.**

- **¿Cómo se pueden evaluar las bajas dosis en radioterapia ?**

Instituto Zunino

Fundación Marie Curie

- Utilizamos el término de «Integral dose»(ID):
- Volumen de tejidos irradiados x (multiplicado por) la dosis absorbida. Se puede también evaluar esta dosis con el DVH (Dose-volume Histogram) «total body»
- Consideramos cada vez más la **“Non-tumor integral dose (NTID)”** que corresponde a la dosis media recibida multiplicada por el volumen de tejidos sanos fuera del PTV.
- **Es otra manera de considerar el volumen de tejidos sanos que recibe dosis de 1 a 5 Gy.**

- La dosis fuera del volumen blanco puede ser clasificada de acuerdo con **tres niveles de dosis aproximados**.
- **Altas dosis** (> 30 Gy o $> 50\%$ de la dosis prescrita): son directamente optimizadas durante el proceso de planificación.
- **Dosis intermedias** (3–30 Gy o 5–50% de la dosis prescrita) son a menudo consideradas durante la optimización pero, por lo general, no son el foco del plan de tratamiento.
- **Bajas dosis** (< 3 Gy o $< 5\%$ de la dosis prescrita) generalmente no son tenidas en cuenta durante la planificación del tratamiento.

- **¿Cuáles son los principales parámetros técnicos responsables de la «NTID» ?**
- **¡Numerosos !**

Instituto Zunino

Fundación Marie Curie

Parámetros principales de la «dosis integral»

- El número de Unidades de Monitor –Mus- (+++) que aumenta los « rayos de fuga »
- El número y los ángulos de los haces , que aumentan la “**in-field nontarget dose**” (dosis al volumen fuera del blanco dentro del campo)
- El volumen tratado
- La energía de los fotones
- El tipo de máquina (fuga del cabezal, producción de neutrones ...)
- El tipo de bunker (más neutrones recibidos por el paciente si el bunker es pequeño)
- El uso de la Arcoterapia (VMAT) : menos MUs, por lo tanto menos ID.
- El uso del «flattening filter», que aumenta los MUs y la producción de neutrones.

¿Dosis Integral y técnicas ?

- Considerando las causas precedentes,
- algunas técnicas modernas fueron consideradas responsables **de aumentar la dosis integral**
- y por consiguiente de aumentar el riesgo de cáncer secundario
- **Con la hipótesis de que el riesgo se podría duplicar (Hall 2003 y Kry 2005) !**

¿Que situación en 2018 ?

- Muchos artículos publicados
- Un trabajo (no publicado) de la ICRP y de la ICRU
- Y un documento importante de 2017 de la AAPM:
- **AAPM TG 158: Measurement and calculation of doses outside the treated volume from external-beam radiation therapy**
- **Stephen F. Kry et al.**
- Medical Physics, Volume 44, 10
October 2017 ,Pages e391–e429

IMRT

- AAPM 2017 :
- Comparada con tratamientos 3D CRT, la IMRT tiene **ventajas y desventajas** con respecto a la dosis al volumen fuera del blanco.
- Los tratamientos con IMRT típicamente tienen dosis más bajas cerca del borde del campo de tratamiento pero más altas lejos del campo de tratamiento.

Irradiated volume
outside the beam

IMRT

Conformal

Low doses

Medium doses

High doses

Target

Irradiated volume
outside the beam

High doses ; IMRT
better

Irradiated volume
outside the beam

IMRT : ¿mejor o peor que Radioterapia Conformada?

- Las dosis más bajas cerca del borde del campo de tratamiento constituyen una clara ventaja
- dado que en 2018 es bien sabido que **la mayoría de los cánceres secundarios aparecieron en órganos cerca del campo de tratamiento** y no en órganos fuera del campo, lo que indica la importancia de la región de alta dosis.

¿Qué energía para fotones en IMRT ?

- AAPM 2017 :
- « *There is a trade-off between high- and low-energy treatments.*
- ***High-energy therapy is associated with neutron production.***
- ***Low-energy therapy results in higher stray photon dose because of the greater number of MUs required. »***

Energía de los fotones

- AAPM :
- Las evaluaciones más recientes de estos valores sugieren que en realidad hay poca diferencia en dosis equivalente fuera del campo como una función de la energía del tratamiento.
- ***« The added neutron contamination at high energy is offset by the added stray photon dose at low energy.***
- **The optimal energy is likely an intermediate such as 10 MV.»**

VMAT :

- La Terapia de arco simple típicamente tiene menos MUs que la IMRT tradicional.
- (El tratamiento con arcos múltiples tendrá más MUs que la terapia con arco simple).
- **Para tratamientos de próstata, se ha informado que las MUs son 16–39% más bajas para VMAT que para IMRT «step-and-shoot » (paso y disparo) y 42–68% más bajas que para IMRT con «sliding window » (ventana deslizante).**

FFF: «Flattening Filter Free»

- Independientemente de la implementación de FFF para tratamientos de campos pequeños (como el usado en SRS/SBRT) y tratamientos con IMRT, **las dosis son consecuentemente más bajas para las entregas con FFF.**
- Los haces de FFF producen dosis similares o ligeramente reducidas cerca del volumen tratado, y dosis considerablemente reducidas más lejos del volumen tratado.
- Incluso para haces de fotones de mayor energía, **la producción de neutrones en modo FFF se reduce hasta un 70%** sobre los haces convencionales aplanados debido a la entrega más eficiente y a la eliminación del filtro aplanador como fuente de neutrones.

Tomoterapia

- AAPM : Se han evaluado la dosis fuera de campo asociada con diversas formas de tomoterapia, incluyendo tomoterapia serial y sistemas helicoidales más modernos.
- Mientras la dosis varía con la complejidad del volumen blanco(target) y el número total de Mus entregadas,
- en general, **la magnitud y distribución de las dosis fuera de campo de la tomoterapia son similares a los de IMRT**

Cyberknife

- Se ha visto que las unidades del Cyberknife original tenían muy altas dosis fuera del campo con respecto a otras modalidades (Petti 2006, ICRP/ICRU, AAPM 2017), debido en gran parte a *radiación de fuga de cabezal ...*

Cyberknife :

- El sistema CyberKnife fue más tarde actualizado con un colimador adicional de tungsteno, *el que reducía las dosis al volumen fuera del blanco dentro de 30 cms del borde del campo a niveles comparables con los de otras modalidades.*
- **Para distancias mayores a 30 cms desde el borde del campo, las dosis con CyberKnife al volumen fuera del blanco permanecen altas con respecto a otras modalidades de tratamiento.**
- Además, algunos tratamientos con CyberKnife requieren **más MUs que otras modalidades**, y la ubicación robótica del acelerador puede colocar la fuente de radiación de fuga **muy cercana al paciente**, contribuyendo ésto a dosis más altas al volumen fuera del blanco.

Radiocirugía Estereotáctica/ Radioterapia Estereotáctica Corporal (SRS/SBRT)

- Además de los linacs tradicionales que usan MLCs o conos, la terapia de radiación estereotáctica puede ser administrada con dispositivos especiales tales como CyberKnife y GammaKnife.
- Estos diferentes dispositivos y diferentes modificadores de haz pueden crear distribuciones de dosis únicas al volumen fuera del blanco. Es importante destacar que la flexibilidad en la dirección del haz durante muchos tratamientos con SRS/SBRT aumenta la dependencia en **los haces nocoplanares** comparada con terapias tradicionales.

Radiocirugía Estereotáctica/ Radioterapia Estereotáctica Corporal (SRS/SBRT)

- **Campos altamente noncoplanares, particularmente campos del vertex**, pueden incrementar la dosis a través del paciente de manera sustancial, a medida que el haz primario descende por el eje del paciente.(AAPM)

• La terapia de protones :

- permite una importante reducción de dosis distal al blanco, lo que da como resultado una dosis integral reducida (típicamente por un factor de 2–3 comparado con IMRT). La ventaja dosimétrica para el paciente es aún mayor cuando se emplea terapia de *protones con barrido* (*scanned beam protontherapy*)

La Braquiterapia :

es probablemente la mejor modalidad de irradiación para minimizar la dosis integral y el riesgo de un cáncer secundario.

Comparada con las técnicas IMRT, los volúmenes que reciben dosis entre bajas a intermedias disminuyen al igual que el riesgo teórico de cáncer secundario fuera de los campos de radiación.

¿Qué sucede con CBCT ?

- **¿Más dosis dispersa que la esperada?**

Instituto Zunino

Fundación Marie Curie

osis a partir de Imagen

- AAPM : La relativa contribución de las dosis calculadas por imagen fuera del volumen tratado (nontarget) comparada con las dosis terapéuticas fuera del volumen blanco, fue evaluada por Halg y col.
- Considerando todas las estructuras fuera del volumen tratado, se encontró que la dosis efectiva era dominada por la dosis terapéutica...
- Pero la dosis por imagen (suponiendo la imagen una vez por fracción) **puede contribuir hasta un 30% de la dosis efectiva fuera del volumen blanco**, pero dependerá directamente del tipo de imagen usada.

SFRO 2017

- **Presentación oral (sin ningún artículo o abstract (??)) por Renaud De Crevoisier :**
- **Estudio Nacional «STIC» («Soutien aux Techniques et Innovations Couteuses»)**
- **Comparó**
- **CBCT diaria y semanal (Cancer de prostata)**

Late toxicity

		No. At Risk						
		0	1	2	3	4	5	6
Daily control group	236	206	161	123	84	31	5	
Weekly control group	234	191	150	108	73	39	5	

5-year rectal toxicity rates (Grade ≥ 2) = 10% in daily group and 13% in control group (p=0.261)

Late toxicity (5 year rate)

	Daily control group (N=236)	Weekly control group (N=234)	HR	P
Rectal				
Diarrhea	37% [30 - 45]	46% [39 - 53]	0.71 [0.53 - 0.96]	0.027
Flatulence	9% [6 - 14]	9% [5 - 13]	1.18 [0.64 - 2.19]	0.592
Hemorrhoids	6% [4 - 11]	7% [4 - 11]	0.81 [0.39 - 1.68]	0.567
Incontinence	11% [7 - 17]	7% [4 - 11]	1.71 [0.86 - 3.42]	0.128
Proctitis	7% [4 - 12]	4% [2 - 7]	1.41 [0.57 - 3.51]	0.456
Bleeding	11% [7 - 16]	21% [16 - 27]	0.51 [0.31 - 0.84]	0.008
	23% [17 - 31]	31% [25 - 38]	0.62 [0.42 - 0.92]	0.016
Bladder				
Hematuria	65% [58 - 71]	63% [56 - 70]	1.06 [0.84 - 1.34]	0.640
Infection	8% [5 - 13]	12% [9 - 18]	0.60 [0.32 - 1.12]	0.107
	4% [2 - 10]	3% [1 - 6]	0.90 [0.30 - 2.68]	0.849
Cystitis	27% [21 - 34]	24% [18 - 30]	1.19 [0.81 - 1.73]	0.382
Incontinence	15% [10 - 22]	13% [9 - 18]	0.95 [0.55 - 1.66]	0.867
Pollakiuria	52% [45 - 59]	57% [49 - 64]	0.97 [0.75 - 1.26]	0.818

Biochemical recurrence

No. At Risk

Daily control group	236	232	207	164	108	46	8
Weekly control group	234	226	213	164	105	54	8

Clinical control

		No. At Risk						
		0	1	2	3	4	5	6
Daily control group	236	232	209	165	112	47	9	
Weekly control group	234	227	216	167	108	57	9	

Recurrence free survival

No. At Risk

Daily control group	236	232	207	163	107	45	8
Weekly control group	234	226	213	164	104	54	8

Bad news !

**En défaveur du contrôle
journalier**

Instituto Zúñiga

Fundación Marie Curie

Overall survival

		No. At Risk						
		0	1	2	3	4	5	6
Daily control group	236	232	212	171	119	53	11	
Weekly control group	234	230	221	180	120	64	12	

Second cancer incidence

No. At Risk

Daily control group	236	231	205	164	114	46	10
Weekly control group	234	229	219	177	115	60	12

Second cancer occurrence

- 5-year second cancer incidence rate:

19% in daily control group and 6% in weekly control group ($p=0.02$)

- **Time from randomization:** median of 31 months (range: 2-80 months)

- **Localization:**

- pelvis (18%): 15% in daily control group and 21% in weekly control group

- abdomen (33%)

- lung (13%)

- head and neck and brain (10%), blood (13%), and skin (8%), unknown (5%)

Conclusion

Bénéfice du contrôle journalier/hebdomadaire:

- diminution toxicité rectale aigue et tardive (grade ≥ 1) (HR=0,7)
- diminution de la récidence biologique (HR=0,5)
- diminution de la récidence clinique (HR=0,5)

→ Recommandations (RECORAD, NCCN): IGRT prostatique quotidienne

- CBCT diaria:
- Toxicidad significativamente menor y menos recidivas: lógicamente esperada...
- PERO ;
- **¡¡Sobrevida significativamente inferior !!**
- ¿¿Aparentemente vinculada a duplicación del riesgo de cáncer secundario con CBCT diaria ?? !!

- **¿Cáncer radio-inducido debido a dosis entregadas con CBCT diaria?**

- **Sorprendente porque:**

- 1. Hallazgo temprano: seguimiento medio de 3 años ...
- 2. Se espera que las dosis fuera de los volúmenes irradiados usando CBCT sean bajas.
- 3. Pacientes ancianos...
- Hoy ; No hay explicación clara!

- **Mientras se espera la explicación :**
- **Favorecer las semillas fiduciales de oro!**
- **Con CBCT semanal**
- **Y al mismo tiempo tratar de evaluar mejor las dosis dadas por CBCT (zonas periféricas y no sólo en el centro del volumen blanco como se ha hecho hasta ahora); trabajo en curso en el CEA France (Commissariat à l'énergie atomique).**

Conclusiones

- En 2018, siempre se deben tener en cuenta las bajas dosis (fuera del blanco).
- Porque posiblemente sean responsables de cánceres secundarios (ver la próxima conferencia), *y de otras toxicidades ??*
- A escala mundial, las técnicas ***modernas no parecen ser responsables*** de más dosis integrales que las técnicas convencionales anteriores.

Conclusiones :

- **No obstante, en algunos casos, la dosis integral puede ser alta y debe limitársela tanto como sea posible;**
- **Selección de la mejor energía de fotones,**
- **Prudencia con la IMRT de múltiples haces.**
- **Cyberknife : tener en mente la fuga de cabezal y el riesgo de cabezal ubicado muy cerca del cuerpo del paciente.**
- **Prudencia con estereotaxia si altamente no coplanar**
- **Prudencia con radioterapia guiada por imagen en algunas condiciones (¿CBCT diaria?)**

¡Muchas gracias!